

아족시스트로빈 · 플루디옥소닐
수화제

유효성분 : Azoxystrobin 25%
 Fludioxonil 25%
기 타 : 계면활성제, 유동제, 증량제 50%
계 통 : 혼합제(스트로빌루린계+시아노피롤계)

(상 표) **선 사 인**

독 성 : 저독성

【적용병해충 및 사용량】

작 물 명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	안 전 사 용 기 준	
					시 기	횟 수
딸 기 양 파	잿 빛 곰 팡 이 병	발병초 7일간격 경엽처리	8g	약액이 충분히 문도록 골고루 뿌림	수확 3일전까지 사용	3회이내
					수확 14일전까지 사용	
잔 디	설 부 소 립 균 핵 병	적설직전부터 10일간격 토양관주처리	4g	1,000ℓ (1ℓ/㎡)	-	-
	등 전 마 림 병	발병초 10일간격 경엽처리				
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리				
오 이	잿 빛 곰 팡 이 병	발병초 7일간격 경엽처리	8g	약액이 충분히 문도록 골고루 뿌림	수확 3일전까지 사용	3회이내
					수확 5일전까지 사용	
참 외	흰 가 루 병	발병초 10일간격 경엽처리			수확 5일전까지 사용	2회이내

【사용방법】

1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 잔디에 충분히 젖도록 관주 하십시오.
2. 약제를 연속하여 사용하면 저항성이 생길 수 있으니 다른 계통의 약제와 바꿔가며 사용하십시오.

【특 징】

1. 이 농약은 스트로빌루린계인 아족시스트로빈과 시아노피롤계인 플루디옥소닐의 합제로 예방과 치료효과가 있습니다.
2. 이 농약은 병원균의 포자발아 억제, 포자형성 저해, 균사생장을 저지하고 예방과 치료효과를 동시에 가지고 있습니다.

△【안전 및 기타 주의사항】



1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.