

전착제

스프레더스티커 분산성액제 유효성분 : spreader-sticker 77%

(상표) **레이트론** 기 타 : 용제 23%

독 성 : 저독성

【적용대상 및 사용량】

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
감	감나무주머니깍지벌레(전착효과)	약충다발생기	5mℓ
강낭콩	파밤나방 (전착효과)	다발생기	
고추	전착효과 (탄저병)	사용할 농약을 희석한 후	
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함)	배추좀나방 (전착효과)	다발생기	
녹두	파밤나방 (전착효과)	다발생기	
단감	감나무주머니깍지벌레	약충 다발생기	
대추	점박이응애 (전착효과)	발생초기	
동파	파밤나방 (전착효과)	다발생기	
매실	점박이응애 (전착효과)	발생초기	
무	배추좀나방 (전착효과)	다발생기	
배	꼬마배나무이(전착효과)		
배추	배추좀나방 (전착효과)	발생초기	
복숭아	점박이응애 (전착효과)	사용할 농약을 희석한 후	
사과	전착효과(겉무늬씩음병)	발생초기	
살구	점박이응애 (전착효과)	다발생기	
순무양배추 (콜라비)	배추좀나방 (전착효과)		
양배추	파밤나방 (전착효과)	다발생기	
완두	파밤나방 (전착효과)	발생초기	
인삼	갈색날개매미충(전착효과)	다발생기	
자두	점박이응애 (전착효과)	발생초기 10일간격	
콩	파밤나방 (전착효과)	다발생기	
파 (쪽파포함)	파굴파리 (전착효과)	다발생기	
팔도	파밤나방 (전착효과)	발생초기	

【사용방법】

1. 사용하고자 하는 약제를 미리 희석한 다음 그 용기에 소정량의 전착제를 첨가하고 잘 저어 뿌리십시오.

【특징】

1. 이 전착제는 대상작물에 습전성 및 부착성을 좋게하여 유효성분의 침투력을 증진시켜 약효를 향상시켜 줍니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 이 약제는 약효를 증진시켜주는 역할을 하는 전착제이므로 이 약제만 단독 살포할 경우 약효 및 약효 증진효과가 없습니다.
2. 사과와 개화기 및 유과기에 사용할 경우 탈색 및 동녹의 우려가 있으므로 절대 사용하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】



【등록회사】 레이트론(경농)